

水害時の消毒について

消毒薬の濃度や用法は商品に記載されている「使用上の注意」を確認してください。

- ・汚れが残っていると消毒効果は弱くなります。**しっかり洗淨・乾燥させてから**消毒を行ってください。
- ・市販の消毒薬の濃度は様々です。希釈して使うものは濃度に注意し、使用直前に希釈してください。
- ・希釈後の消毒薬はなるべく使い切ってください。保管する場合は、容器に薬剤名を大きく書く、幼児の手の届かないところに保管するなど、誤飲しないように注意してください。
- ・絶対に他の消毒薬や洗剤と混ぜないでください。
- ・消毒にあたっては豊橋市ホームページ「浸水被害発生時の対応について」内の「作業時の注意事項【消毒時】」を参照してください。<https://www.city.toyohashi.lg.jp/23631.htm>

消毒薬(成分)	消毒対象	調整方法	使用方法
次亜塩素酸ナトリウム (ハイターやブリーチなどの家庭用塩素系漂白剤(原液濃度は約5%)でもよい)	食器類 流し台、浴槽	0.02%に希釈する 【原液が5%の場合】ペットボトルのキャップ1杯(約5ml)を水1ℓに希釈する	① 水と洗剤で洗う ② 調整した液に5分間漬けるか、液を含ませた布で拭き、その後、水洗い・水拭きする ③ よく乾燥させる
! 脱色や金属腐食作用があるので注意すること	床、壁 家具類	0.1%に希釈する 【原液が5%の場合】ペットボトルのキャップ2杯(約10ml)を水500mlに希釈する 【原液が10%の場合】キャップ1杯(約5ml)を水500mlに希釈する	① 汚れを洗い流すか水拭きしてから十分乾燥させる ② 調整した液を浸した布でよく拭く ③(次亜塩素酸ナトリウムを使用した場合)金属面や木面は、水で二度拭きする
10%塩化ベンザルコニウム (逆性石けん)	食器類 流し台、浴槽 床、壁 家具類		
消毒用アルコール (アルコール濃度70%以上のもの) ! 火気のあるところでは使用しないこと	床、壁 家具類 食器類 流し台、浴槽	希釈せず原液のまま使用する	① 水と洗剤で洗う ② アルコールを含ませた布で拭く

【消毒薬の希釈例1】

5%の薬剤ならキャップ2杯(約10ml)
10%の薬剤ならキャップ1杯(約5ml)

500mlのペットボトル一杯まで水を加えると
濃度約**0.1%**



【消毒薬の希釈例2】

5%の薬剤を大さじ2杯(約30ml)

10ℓのバケツの七分目まで水を加えると
濃度約**0.02%**

